




【mFOLFOX6+アバステン療法について】 (5-FU+レボホリナート+エルプラット+アバステン)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
アバステン注	抗がん剤です	30分	💉														💉																💉
グラニセトン注 デキサート注	吐き気止めです	15分	💉														💉																💉
エルプラット注	抗がん剤です	2時間	💉														💉																💉
レボホリナート注	5-FUの効果を強める薬です		💉														💉																💉
5-FU注	抗がん剤です	約5分	💉														💉																💉
5-FU注(持続)	抗がん剤です	46時間	←💉→														←💉→																←



この週はお休みです。



この週はお休みです。

😊 治療による副作用

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目					
自覚症状	過敏症																																		
	食欲不振・吐き気																																		
	手足のしびれ																																		
	口内炎																																		
	色素沈着																																		
	下痢																																		
検査値	白血球減少																																		
	赤血球減少(貧血)																																		
	血小板減少																																		
	肝機能低下																																		

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。