



1月1日より、新しい医師が着任しました。

今後も職員一同協力し、質の高い医療・福祉を提供してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。



外科 医師

土屋 博 (つちや ひろし)

出身大学

浜松医科大学 (2013年 卒業)

専門分野

▶ 一般外科

資格

・日本外科学会:外科専門医
・日本消化器外科学会:消化器外科専門医
・日本消化器外科学会:消化器がん外科治療認定医
・日本がん治療認定機構:がん治療認定医
・日本ICD制度協議会:ICD

所属学会

・日本外科学会
・日本消化器外科学会
・日本内視鏡外科学会
・日本癌治療学会



麻酔科 医師

松本 りか (まつもと りか)

出身大学

愛知医科大学 (2016年 卒業)

専門分野

▶ 手術麻酔

資格

・厚生労働省:麻酔科標榜医

所属学会

・日本麻酔科学会
・日本臨床麻酔学会
・日本ペインクリニック学会

次のページは、「脊椎圧迫骨折」について

Matsunami Information

NEWS

発熱症状で受診される患者さんへ
ご来院される前に下記をご確認の上、ご連絡をお願いいたします。

1 当院がかかりつけ、通院中等で、当院への受診をご希望される場合

- 『来院前AI問診』を行ってください。
問診終了後に表示される『来院前問診番号』を控えてください。
- 来院前に、当院へお電話をください。
電話番号: **058-388-0111 (代)**
氏名、生年月日、性別、車種(色・ナンバー)、保険証番号、
来院前問診番号(PH○○○○○○○○)、診察券番号を確認させていただきます。

AI問診
ページ



2 帰国者・接触者相談センター(受診・相談センター)へ相談する場合

最寄りのセンターへ電話で相談し、指示に従ってください。
※詳しくは、帰国者・接触者相談センター(岐阜県ホームページ)をご確認ください。

岐阜県HP
相談・受診に
関するページ



来院される際の 注意点

- 必ずマスクを着用してください。
- 駐車場に到着されたら、ご連絡(TEL:058-388-0111)ください。
- お手洗いをご利用の際は、あらかじめ職員にお声がけください。
- 待合場所、移動経路、診察につきまして、
特別な配慮をしておりますので、長くお待ちいただく場合があります。ご了承ください。

新型コロナウイルス感染症対策に関わる支援のご報告

あたたかいご支援をいただきました。改めて厚く御礼を申し上げます。
ご寄贈の品は、当院で大切に使用させていただきます。

掲載了承済み・順不同(2021年1月25日時点)

氏名・企業名

ご支援いただいた内容

東洋羽毛東海販売株式会社 様

寝袋

駐車場のご案内

立体駐車場への入庫は、左折のみとさせていただきます。右折入庫は渋滞の原因となりますので、右折入庫をなさらないよう、ご理解とご協力をお願いいたします。



ARアプリ COCOAR2導入しました!!

アプリを起動し、
『月刊まつなみ』の表紙でお試しください!!



ダウンロード・詳しい使い方は
こちらから!(リンク先は病院HPです)



社会医療法人蘇西厚生会
松波総合病院

〒501-6062
岐阜県羽島郡笠松町田代185-1

TEL 058-388-0111 (代)

FAX 058-388-4711

<http://www.matsunami-hsp.or.jp/>



高齢者に多くみられる「^{せき つい あっ ぼく こっ せつ}脊椎圧迫骨折」。

この骨折を放置すると、寝たきりになってしまう可能性を高めてしまいます。
 当院で行っている、体の負担が小さい治療法をご紹介します。

脊椎圧迫骨折とは？

人間の背骨は、24個の小さな骨(椎体:ついたい)で構成されていて、体の重みをバランスよく支える役割を果たしています。この背骨が押しつぶされたように変形してしまう骨折を「脊椎圧迫骨折」と言います。

脊椎圧迫骨折の主な原因と言われているのが、「骨粗しょう症」です。骨粗しょう症は、運動不足や偏った食生活、喫煙などの生活習慣や加齢などが原因で、骨密度が低下し、骨の内部がスカスカになり、もろくなることで、骨折しやすくなる病気です。骨粗しょう症が進行すれば、尻もちをついたり、くしゃみをしたたり、急に重いものを持ち上げたりした際などに、椎体がつぶれてしまうことがあります。椎体をつぶれたままにしておくと、背骨全体のバランスが崩れ、他の椎体に負担がかかり、新たな骨折を引き起こしやすくなり、最終的には寝たきりの生活になる危険性を高めてしまいます。

当院では、この脊椎圧迫骨折の治療に、脊椎外科部長・脊椎外科センター長の日置医師が治療にあたっています。日置医師は、このあとご紹介する「経皮的椎体形成術(BKP:Baloon Kypoplasty)」の治療を専門に行っている医師です。2016年より治療を開始し、県内の総合病院の整形外科では一番多い、年間約30件～40件、累計約150件の治療をこれまでにを行っています。

脊椎圧迫骨折の治療方法:「保存的療法」、「外科的療法」

脊椎圧迫骨折の従来からある治療方法に、「保存的療法」、「外科的療法」があります。


保存的療法は、コルセットやギブスを装着したまま、ベッドの上で安静にし、痛み止めや骨粗しょう症の薬を使用する方法です。この保存的療法は、日常生活の行動範囲が制限され、長期の入院が必要になります。

外科的療法は、手術で骨を移植したり、金属製のネジや棒で骨を固定(脊椎固定術)する治療方法です。骨破壊や背骨の変形がひどくなってきた場合などに、この治療法で行います。ただ、この手術は身体への負担が大きいため、ご高齢で合併症を抱えている患者さんには、治療を行えない場合があります。



▲手術後レントゲン

脊椎圧迫骨折の治療方法:「経皮的椎体形成術(BKP)」



▲手術後レントゲン


経皮的椎体形成術(以下BKP)は、背中に2箇所1cmほどの小さな穴を開けて、圧迫骨折した部分を風船(バルーン)状の器具で広げて、医療用の充填剤(骨セメント)を注入していきます。この治療方法は、約1時間程度と比較的短い時間で行う手術で、注入した骨セメントは、手術中に固まります。術後早期に痛みが改善しますが、骨粗しょう症が完治したわけではないので、無理をすると隣の背骨が骨折してしまうこともあるため、継続的な治療が必要です。

BKPは、体の負担が小さい「低侵襲治療(ていしんしゅうちりょう)」と言われています。全身状態が悪く、大きな手術を受けることができない患者さんは、このBKPであれば手術が可能という場合があります。脊椎圧迫骨折の診断で治療を受けていて、数週間経過しても痛みが良くならない場合は、ご相談ください。


手術手順




背中から針を挿れ、
圧迫骨折した椎体に小さな
風船がついた器具を挿入します。



風船を徐々に膨らませ、
つぶれた骨を持ち上げ、
骨折前の形にできるだけ戻します。



風船を抜くと、椎体内に空間ができ、
その空間を満たすように
骨セメントを注入します。



手術は約1時間程度で終了し、
注入した骨セメントは手術中に
固まります。

担当医師プロフィール



整形外科 脊椎外科 部長
 脊椎外科センター長
日置 暁
 (ひおき あきら)
 (2001年 福井医科大学 卒業)

専門分野

▶ 脊椎脊髄外科

資格

・日本整形外科学会:整形外科専門医、脊椎脊髄病医
 ・日本脊椎脊髄病学会・日本脊髄外科学会:脊椎脊髄外科専門医
 ・日本脊椎脊髄病学会:脊椎脊髄外科指導医

所属学会

・日本整形外科学会
 ・日本脊椎脊髄病学会
 ・日本側彎症学会
 ・日本脊椎インストゥルメンテーション学会
 ・中部日本整形外科学会災害外科学会

略歴

・2001年 国立福井医科大学(現:福井大学医学部) 卒業
 ・2001年 岐阜大学医学部附属病院 研修医
 ・2003年 公立小浜病院 整形外科 医員
 ・2004年 揖斐厚生病院 整形外科 医員
 ・2010年 岐阜大学大学院 医学系研究科 卒業
 ・2010年 岐阜大学医学部附属病院 整形外科 医員
 ・2014年 岐阜大学医学部附属病院 整形外科 助教 臨床講師
 ・2014年 松波総合病院 整形外科 脊椎外科部長 脊椎外科センター長