



【キイトルーダ療法について】



様

□ コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
キイトルーダ注	抗がん剤です	30分										この週はお休みです。							この週はお休みです。					

😊 治療による副作用

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
自覚症状	大腸炎・重度の下痢	大腸に炎症が起こることで、腹痛や下痢、血便・粘り気のある便・黒っぽい便となることがあります。ひどい場合はすぐに受診してください。																					
	1型糖尿病(劇症型含む)	のどが渇く、水を多く飲む、尿量が増える、体重が減る、等の症状があればお知らせください。急速に悪化する場合もあるので気づいたらすぐ受診してください。																					
	アレルギー様症状(インフュージョンリアクション)	発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																					
	他、パンフレット参照																						
検査値	甲状腺機能障害	疲れやすい、体重の増加または減少、寒気がする、イライラする、などの症状が出ることがあります。																					
	肝障害	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなることがあります。																					
	腎障害	顔や手足のむくみ、尿が少ない・出ないなどの症状が出ることがあります。																					

副作用が出やすい時期が決まっていないお薬です。
点滴がない期間や投与終了後も注意してください。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用の一部を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。